


모든 종류의 협심증에

# 근본\*적인 1차 옵션 HERBEN

\*심근산소 요구량 감소 및 산소 공급량 증가를 위한\* 본격적인 Diltiazem Hydrochloride 30mg, 90mg, 180mg



All types of  
**Angina**  
Treatment

The  
**HERBENS**


180mg  
30mg

90mg  
90mg

**Reference** 1. Ferrari R, Pvasini R, Balla C. The multifaceted angina. *European Heart Journal Supplements*. 2019;21(Supplement\_C):C1-C5. 2. Rodríguez Padial L et al. Clinical Experience with Diltiazem in the Treatment of Cardiovascular Diseases. *Cardiol Ther*, 2016;5(1):75-82.

**[제품명]** 헤르벤 정 30mg / 헤르벤 서방정 90mg / 헤르벤 서방캡슐 180mg / 헤르벤주50mg **[성분·함량]** Diltiazem HCl 30mg / 90mg / 180mg / 50mg **[효능·효과]** 헤르벤정, 헤르벤서방정 90mg, 헤르벤서방캡슐 180mg; 협심증, 본태성 고혈압(경증-중등도); 헤르벤주 50mg; 1. 빈맥성부정맥(상실성), 2. 수술시 이상 고혈압의 급구치치, 응급성고혈압(고혈압성발증), 3. 불안정 협심증 **[보형코드]** 1) 헤르벤 정 30mg; 640003930 2) 헤르벤 서방정 90mg; 640003910 3) 헤르벤 서방캡슐 180mg; 640003920 **[용법·용량]** **[경구 : 서방형 캡슐제]** 성인: 염산딜티아젬으로서 1일 1회 180mg을 경구투여한다. 증상에 따라 1회 360mg까지 증량할 수 있다. 노인 및 간·신장에 환자: 초회량으로 1일 1회 90-120mg을 투여한다. 투여중에 심박동수를 측정하여 50회 이하로 저하된 경우에는 증량하지 않는다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다. **[경구 : 서방형 정제 30mg]** 성인: 염산딜티아젬으로서 1회 30-60mg 1일 3회 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다. **[경구 : 서방형 정제 90mg]** 성인: 염산딜티아젬으로서 1회 90mg 1일 2회 경구투여한다. 필요하면 1회 90-180mg까지 증량할 수 있다. / 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다. **[주사제]** 이 약은 5ml 이상의 생리식염주사액 또는 포도당주사액에 용해하여 다음과 같이 투여한다. 1. 빈맥성부정맥(상실성) 성인: 염산딜티아젬으로서 1회 10mg을 약 3분간에 걸쳐 천천히 정맥주사한다. 2. 수술시 이상 고혈압의 급구치치 ① bolus 정맥주사 - 성인: 1회 10mg을 약 1분간에 걸쳐 천천히 정맥 주사한다. ② 점적 정맥주사 - 성인: 체중 kg당 5-15µg을 1분간에 걸쳐 점적 정맥주사한다. 목표치까지 혈압을 내린 후 혈압을 관찰하면서 점적속도를 조절한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다. **자세한 주의 사항은 별도의 제품설명서를 참조하십시오. (www.mt-pharma-korea.com)**

판매원 미쓰비시타나베파마코리아



서울시 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 21층  
www.mt-pharma-korea.com | Tel.02-579-0121

제조·판매원 에이치케이이노엔



서울시 중구 을지로 100 파인에비뉴  
http://inno-n.com/ | Tel.02-6477-0000

HER2021-01